

Quanto á tireoide nada está estabelecido. Em casos de puberdade retardada a amigalectomia transporta à normalidade. Com a hipofise as relações são mais intimas e melhores estudadas. Foi descrito um síndrome, de Citeli, que seria devido a um hipofuncionamento do lobo anterior da hipofise, encontrado em muitos adenoideus — sonolencia, insônia as vezes, falta de memoria, torpor intelectual, falta de energia para o trabalho e dificuldade para concentrar a atenção. Esse síndrome assim constituído, em resumo, seria um síndrome psiquico especial, completo ou frusto. De maneira que as relações mais evidentes são as patológicas.

Terminou o autor, dizendo que as teorias existentes sobre a função das amígdalas são muitas, mas que necessitam ser aprovadas pela clinica e pela experimentação e conclue aconselhando a amigdalectomia nos casos de indicação indiscutível, o que não ocasiona perturbação alguma ao organismo.

— ● —

Comment on a New Case of Hypertrophic Pyloric Stenosis Treated Successfully by Pyloroduodenal Gavage. L. Velasco Blanco, Arch. am. de med. 20:45, 1945.

Assunto tirado do American J. of Diseases of children, Fevereiro de 1946.

O Autor tratou uma criança de um mês com sintomatologia característica de estenose hipertrófica do pilóra, tratamento este médico, incluindo antiespasmódicos, fenobarbital, tiamina, flúidos por via retal e alimentação por leite de peito por meio de catéter introduzido até o antro (técnica de Hess). Depois de poucos dias, a criança começou a melhorar, tendo chegado á cura completa.

Este é o nono paciente para o qual o Autor emprega esta terapeutica, obtendo a cura em 100% dos seus casos. O quadro é raro na Argentina, pois sómente se conta 9 crianças de 50.000 hospitalizadas no Serviço do Autor.

Denise Atlentheïn.

— ● —

4 — O TRATAMENTO DO EDEMA

INFLUENCIA DO REGIME ACIDOTICO E DA ADMINISTRAÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE LÍQUIDO

R. Valdivieso; P. Toledo; H. Richter; E. Valenzuela C.
El Dia Medico, 16 : 404, 22 Abril, 1946.

Inicialmente são revistas as idéias de Schemm sobre o tratamento dos edemas pelo emprego de grandes quantidades de liquido e de uma dieta acidotica.